"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto causa irritación leve a los ojos y la piel.
- Evitar la inhalación del producto durante la aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestiónón: inducir el vómito.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel; lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico; dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 **CIPROSQUIM: 0800-5-0847**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No aplicar en suelos con napa freática superficial.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

GALECUR® 25 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

Composición:

Tebuconazole	250 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: YC Agro Peru S.A.C.

Importado y Distribuido por:
YC Agro Peru S.A.C.
Calle Pucala 324 Dept. 201 Urb. C.C.
Monterrico Santiago de Surco Lima Peru
Teléfono:+51 98327[illegible]
E-mail: sales@ycagro.pe

Formulado por:
Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited
12A8 Yinhaofang Building, No.11018 Shennan Road,
Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.
Telefono: +86 755 86182089
E-mail: director@yanchengchem.com

Lote No.:27092020
Fecha de Formulación:27/09/2020
Fecha de Vencimiento:26/09/2022 **Contenido Neto: 1L**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GALECUR 25 EW es un fungicida sistémico usado en forma preventiva, curativa y erradicante que actúa inhibiendo la síntesis de esteroides en los hongos patógenos. Se aplica antes o durante la aparición de Botrytis, Oidium, Pyricularia y Roya. Los cultivos en que se recomienda son: vid, manzano, mandarina, arroz, espárrago, mango, tomate, para y café.

GALECUR 25 EW se aplica como aspersión directa sobre el follaje mediante equipos aplicadores convencionales, usando agua como transportador. Medir la cantidad requerida de **GALECUR 25 EW** y disolver en el tanque de aplicación con una pequeña cantidad de agua. Completar la cantidad de agua necesaria. Aplicar mediante aspersión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200L	(días)	(ppm)
Vid	Oidium	Uncinula necator	0.30	0.06	14	2.00
Manzano	Oidium	Podosphaera leucotricha	0.40	0.08	14	0.50
Mandarina	Botrytis	Botrytis cinerea	0.75	0.15	14	0.05
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	0.75	0.25	7	0.05
Arroz	Quemado	Pyricularia oryzae	0.75	0.375	35	2.00
Mango	Oidiosis	Oidium mangiferae	0.57	0.100	20	0.05
Tomate	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.25	7	0.20
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	-	0.2-0.3	30	0.01
Café	Roya amarilla	Hemileia vastatrix	-	0.2-0.25*	30	0.1

P.C.: Periodo de carencia (días) **L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)**
*** Se sugiere usar la menor dosis en estados iniciales de la enfermedad y la dosis mas alta cuando hay mayor presión de la enfermedad.**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se presenten las condiciones predisponentes para el desarrollo de estas enfermedades. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con productos extremadamente ácidos o alcalinos (pH<3 y pH>10). En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO